

核准日期：2007 年 05 月 10 日
修改日期：2015 年 08 月 26 日
2017 年 12 月 29 日
2019 年 03 月 18 日

盐酸倍他司汀口服液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：儿童忌用。

【药品名称】

通用名称：盐酸倍他司汀口服液


商品名称：西其汀

英文名称：Betahistine Hydrochloride Oral Solution

汉语拼音：Yansuan Beitasiting koufuye

【成份】盐酸倍他司汀

化学名称：N-甲基-2-吡啶乙胺二盐酸盐。



化学结构式：

分子式： $C_8H_{12}N_2 \cdot 2HCl$

分子量：209.12

【性状】本品为微黄色的透明液体，味甜，微苦。

【适应症】主要用于美尼尔氏综合征，血管性头疼及动脉硬化，并可用于治疗急性缺血性脑血管疾病，如脑血栓、脑栓塞、一过性脑供血不足等；高血压所致直立性眩晕、耳鸣等亦有效。

【规格】10ml：20mg

【用法用量】口服。一次 10-20mg，一日 30-60mg，一日最大量不超过 60mg。

【不良反应】用本品偶有口干、胃部不适、心悸、皮肤瘙痒等，个别病例偶有恶心、头晕、头胀、出汗等，一般不影响继续服药。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】1、消化性溃疡、支气管哮喘、褐色细胞瘤及孕妇慎用；2、老年人使用注意调节剂量；3、勿与组织胺类药物配用；4、儿童忌用；5、本品含蔗糖，糖尿病患者慎用；6、如发现本品性状改变、渗漏、漏气、瓶身破损或有异物者均禁止使用；7、将本品放在儿童不能接触的地方。

【孕妇及哺乳期妇女用药】慎用。

【儿童用药】儿童忌用。

【老年用药】老年人使用注意调节剂量。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】本品为双胺氧化酶抑制剂，对脑血管、心血管，特别是对椎底动脉系统有较明显的扩张作用，显著增加心、脑及周围循环血流量，改善血循环，并降低全身血压，此外能增加耳蜗和前底血流量，从而消除内耳性眩晕，耳鸣和耳闭感，还能增加毛细血管通透性，促进细胞外液的吸收，消除淋巴内水肿；能对抗儿茶酚胺的缩血管作用及降低动脉压，并有抑制血浆凝固及 ADP 诱导的血小板凝集作用，能延长大白鼠体外血栓形成时间，还有

轻微的利尿作用。

【药代动力学】口服后在人体内很快被吸收，大部分以代谢物形式在尿中排出，犬口饲后尿中曾检出代谢物（2-吡啶基）乙酸。LD50 大鼠（口服）3.04g/kg。

【贮藏】密封，在阴凉处(不超过 20℃)保存。

【包装】管制口服液体瓶，6 支/盒；9 支/盒；10 支/盒；15 支/盒；20 支/盒。

【有效期】24 个月

【执行标准】WS₁-(X-067)-94Z

【批准文号】国药准字 H23020091

【生产企业】

企业名称：黑龙江中桂制药有限公司

生产地址：黑龙江省庆安县东城区

邮政编码：152400

电话号码：0455-4313333

传真号码：0455-4313355

网 址：www.zhongguizy.com